



Sjúkdómar og forvarnir í bleikjueldi


Ráðstefna um framtíðarsýn og stefnumótun
í íslensku bleikjueldi
27. október 2006

Gísli Jónsson
Landbúnaðarstofnun

Sigurður Helgason
Tilraunastöð HÍ, Keldum



Fisksjúkdómar og fyrsta greining á Íslandi



- * Hefur orðið vart sem klíniskur sjúkdómur í eldisstöðvum síðustu misserin. Finnst sem dulið smit í villtum laxfiskum.
- ** Hefur breiðst út um allt land. Gott bóluefni notað síðan 1992 í lax og **bleikju**, en ekkert ennþá til fyrir þorsk.
- *** Var lengi vel til vandræða í strandeldisstöðvum en sést einnig í sjókvíaeldi. Bólusett síðan vorið 1993.
- # Fyrsta tilfellið í laxaseiðum í Hvalfirði árið 1990, síðan greinst í **bleikju**, regnboga og aftur í laxi síðan 1997. Fyrsta tilfellið greindist í þorski (10-30 gr.) haustið 2005.
- ## Fyrsta greining í sjókvíalaxi á NA-landi í mars 1993. Haldið niðri með vel virku bóluefni.
- ### Greindist í villtum laxi og urriða í Elliðaánum sumarið 1995 og fram á vor 1996 (+ Hafbeitarfiskur/seiði í Kollafirði).
- ° Fyrsta greining í nóv. 2001, (2ja kg þorskur af villtum uppruna alinn í strandkeri). Gott bóluefni síðan sumar 2003. Fyrsta greining í sandhverfu (5-10 gr.) haustið 2004.



= Sjúkdómar sem hrjád geta **bleikju**.

Sjúkdómar og önnur óáran í íslensku fiskeldi								 KELDUR	 LANDBÚNAÐARSTOFNUN
Sjúkdómar/kvillar:	Lax	Bleikja	Regnbogi	Þorskur	Lúða	Sandhverfa	Hlýri	Sæeyra	
Hitraveiki									
Kýlaveikibróðir									
Nýrnaveiki									
Rauðmunnaveiki				okt. 2005					
Söðulsár/roðrot									
Vetrarsár									
Vibríuveiki									
Þekjublaðra (Chlamydia)									
Sæeyrnavisnun									
Burstaormur									
Fiskilús/laxalús									
Hýli (Trichodina)									
Illa (krabbadýr)									
Kostia									
Roðflyðrusýki (Gyrodactylus)				apríl 2006					
Hnyð (Ichthyophonus hoferi)									
Kudóaveiki (Myxospora)									
Lóma (Myxospora)									
Æxli í gervitálknum									
Hryggskekkja									
Marglyttur									
Mattur augasteinn									
Þörungar									

Sjúkdómstílfelli í eldisstöðvum 1993 - 2006

	Fjöldi nýsmitaðra fiskeldisstöðva pr. ár:													
Sjúkdómur:	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993
Hitraveiki	0	0	0	0	0	1 [*]	0	1 [*]	1 [*]	0	0	0	0	1 [*]
Kýlaveikibróðir	8 ^{#*}	3 [#]	6 ^{°#}	4 ^{°#}	2 ^{°*}	2 ^{#*}	0	0	0	1 [*]	0	0	0	1 [*]
Nýrnaveiki	4 ^{°*}	3 ^{°*}	3 ^{°*}	1 [°]	1 [°]	0	0	0	1 [°]	0	0	1 [*]	4 ^{°*}	1 [*]
Rauðmunnaveiki	1 [°]	3 ^{#°}	0	4 ^{°*}	0	2 ^{°*}	1 [°]	0	0	2 ^{°*}	0	0	0	0
Vetrarsár	0	0	0	1 [*]	1 [*]	0	0	0	0	0	0	0	1 [*]	0
Vibrúveiki	3 [#]	4 [#]	3 [#]	2 [#]	0	1 [#]	0	0	0	0	0	0	1 [*]	0
Þekjublaðra	1 [#]	1 [#]	1 [#]	0	0	0	0	0	0	3 ^{°#}	0	0	0	1 [*]

* Strandeldisstöð (selta: 10 - 25%) • Sjókvíaelði (full selta) ° Klak- og seiðaeldisstöð (ferskvatn) # Eldi sjávarfiska (full selta)

- **Nýrnaveiki** (*Renibacterium salmoninarum*)

Nýrnaveiki er án efa sá smitsjúkdómur sem valdið hefur íslensku fiskeldi hvað mestum fjárhagslegum skaða. Saga liðinna áratuga sýnir að nýrnaveikin hefur komið í bylgjum en ávallt hefur tekist að ráða niðurlögum hennar. Veikin var illvíg upp úr 1985, ekki hvað síst í eldi hafbeitarseiða. Þá komu upp erfið tilfelli nánast samtímis í nokkrum eldisstöðvum upp úr 1994 og síðasta farsótt hóf innreið sína síðla árs 2003. Eldi bleikju hefur ekki orðið varhluta, ekki síst nú í upphafi síðustu bylgju þegar önnur tveggja kynbótastöðva okkar var slegin út tímabundið. Ítarleg úttekt á klakfiski hefur átt sér stað síðan 1985. Engin lækning er til og bóluefni ekki fáanleg. Bakterían leynist í villtum fiski og getur þannig hæglega borist í eldisstöð með frískum smitbera.



Vökvasöfnun í kviðarholi



Bólguhnútar í nýra



Útþrotun í kviðarholi



Bólguhnútar í nýra



• **Kýlaveikibróðir** (*Aeromonas salm.* sp. *achromogenes*)

Kýlaveikibróðir er útbreiddust allra bakteríusýkinga í íslensku fiskeldi. Hér á árum áður var ekki óalgengt að stöðvar væru að missa 15 - 25% af heildar lífpunga áður en til slátrunar kom. Í dag er smit til staðar í öllum okkar stærstu strandeldisstöðvum (hálfseita) ásamt í umhverfi sjókvía. Viðkvæmastur er laxinn og þar næst **bleikja**, hlýri, þorskur, lúða og sandhverfa. Regnbogi er nánast ónæmur. Bólusetningar hófust vorið 1992 með góðum árangri í lax- og bleikjueldi. Með auknu umfangi þorskeldis hefur bakterían orðið æ ágengari en virkt bóluefni fyrir þorsk hefur ekki enn litið dagsins ljós. Smit leynist víða í villtum fiski hér við land og árlega verður vart við einstaka sjúka laxfiska í laxveiðiám. Nýtt birtingarform í **bleikju** 2006!





Bleikjuseiði, maí 2006

Ljósm.: ÁK




Bleikja, ágúst 2006

Ljósm.: ÁK






Ljósm.: ÁK



Ljósm.: ÁK


• *Costia* (*Ichthyobodo necator*)

Costia er hinn versti ógnvaldur og veldur árlega töluverðum búsifjum í íslensku fiskeldi. Sníkilsins verður sérstaklega vart í eldi laxaseiða, en allar fisktegundir (bæði ferskvatns- og sjávartegundir) eru móttækilegar og þarf stöðugt að vera á verði. Mestur er skaðinn í frumeldi þar sem tálnn seiða verða hreinlega óstarfhæf á örstuttum tíma með miklum dauða í kjölfarið. Formalínböðun er enn í dag öflugasta meðhöndlunin/forvörnin.



- **Hýli** (*Trichodina* sp.)

Trichodina er algengt sníkjudýr hjá fiskum af flestum tegundum, ekki síst í **bleikjueldi**. Bifdýr þetta smitar beint á milli fiska án millihýsils og sýkir bæði roð og tálkn. *Trichodina* fjölgar sér með tvískiptingu og getur sýking magnast mjög hratt við ákveðnar aðstæður; mikinn ásetning, háan eldshita og ofgnótt fóðurleifa. Væg sýking veldur ertingu og kláða og dregur úr fóðurnýtingu og vexti. Ef sníkillinn nær að fjölga sér óheft og magnast upp, sérstaklega í tálknum, er stutt í afföll. Formalínböðun er áhrifarík meðhöndlun og ætti reglubundin böðun að vera hluti af starfsskipulagi á hverri eldisstöð sem hluti af forvörnum.



Forvarnir í bleikjueldi

Sjúkdómar sem verjast má með bóluefnum:



- Kýlaveikibróðir
- Rauðmunnaveiki



Engin bóluefni til gegn Nýrnaveiki!


Sjúkdómar sem verjast má með lyfja-/efnameðferð:

- Bakteríusýkingar (÷ nýrnaveiki)
- Ytri sníkjudýr

Sjúkdómar þar sem hvorki lyf né bóluefni gagnast:

- Nýrnaveiki
- Veirusýkingar

Notkun sýklalyfja í fiskeldi 1990 - 2005







Notkun sýklalyfja í fiskeldi 1990 - 2006



Nýtt bóluefni gegn
kýlaveikibróður



Heildarnotkun sýklalyfja pr. tonn sláturfisks 1990 - 2005



Þakka áheyrnina!

